

# ΑΤΥΠΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ?

Κ.Γ.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Διδακτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ-Δ/ντης Ορθοπαιδικου τμηματος Γ.Ν.Λαμιας

# 1η Περίπτωση

- Γυναίκα 69 ετών με μικρής βίας Υ/Τ κατάγμα (δε)
- Προεγχειρητικός εργ. Έλεγχος : κφ
- Χειρουργική αγωγή : εσωτερική οστεοσυνθεση (long g-nail)

**.Αλγος μηρων αμφω απο μηνων-συντηρητικη αγωγη χωρις διακοπη διφωσφονικων**

**.Αγωγη για οστεοπορωση με διφωσφονικα για περισσοτερο απο 15 χρονια( 2011-2014: ζολενδρονατη και κατοπιν μεχρι σημερα ιμπανδρονατη)**

2004	0.882	-2,5
2006	0.928	-2,1
2008	0.918	-2,2
2010	0.963	-1,8
2012	0.961	-1,8
2014	0.977	-1,7
2016	0.995	-1.5
2018	1.043	-1.2

Παραγοντες κινδυνου :(-)



## 2η Περίπτωση

- Γυναίκα 68 ετών με μικρής βίας κατάγμα διαφυσης δε μηριαίου
- Προεγχειρητικός εργ. έλεγχος : κφ
- Χειρουργική αγωγή : εσωτερική οστεοσυνθεση ( πλακα - βιδες)

# ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Ραιβοτητα μηρων αμφω -Ατυπη συμπτωματολογια
- Ληψη αντιπηκτικων – κολπικη μαρμαρυγη
- Αναφορα για αγωγη οστεοπορωσης με ιμπανδρονατη για 4 εως 5 χρονια

# ΠΩΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

- .Καθυστέρηση πωρωσης**
  - .Θραυση υλικου οστεοσυνθεσης μετα 5 μηνες**
  - .Επανεγχειρηση με ενδομυελικη ηλωση – μοσχευματα**
- πωρωση καταγματος**





